



REF Catalog No.

N335
N336

Manufactured by
NEOTECH PRODUCTS LLC
28430 Witherspoon Parkway , Valencia, CA 91355, USA
1-800-966-0500 • neotechproducts.com

EMERGO EUROPE
EC REP Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem, The Netherlands

MD Medical Device



Made in USA

D509 Rev E

English

NeoHeart® ECG Pad
INDICATIONS FOR USE

NeoHeart is a set of three attached ECG electrodes used on neonates, infants, and pediatric patients.

DIRECTIONS FOR USE

Application

Step 1 Wipe and remove any excess moisture from where NeoHeart will be applied.

Step 2 Peel and discard liner. Apply immediately after liner is removed.

Step 3 Place NeoHeart on patient's back and connect to ECG monitor cable. The pad should be oriented so the point of the heart is pointing toward lower extremities.

Step 4 Confirm quality of ECG tracing.

Note: if QRS is stable but appears small or dampened, consider changing to a different lead on the monitor or increasing the size of the waveform. If small or dampened waveform persists, application to the patient's chest may result in a stronger waveform.

CAUTION: If placed on patient's chest, the white wire electrode will be on patient's left side. Insert into monitor accordingly.

Removal

Step 1 Remove NeoHeart within 24 hours.

Step 2 Saturate the exposed (fabric) side of the NeoHeart with water or saline.

Step 3 Slowly peel NeoHeart away from skin as you continuously swab the skin and adhesive side of the NeoHeart with water or saline.

CAUTIONS & WARNINGS

Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician. NeoHeart ECG Pad should only be used while patient is under continuous direct supervision of healthcare professionals.

NeoHeart is designed for back application. If placed on patient's chest, the white wire electrode will be on patient's left side. Insert into monitor accordingly. Do not apply to open wounds or broken skin. Discontinue immediately if skin irritation occurs. Discard NeoHeart 24 hours after opening pouch. Disposable. Do not reuse. Single patient use only.

European Union: MDR EU 2017/745

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to Neotech Products and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Français

NeoHeart® Électrode ECG
INDICATIONS D'UTILISATION

NeoHeart est un ensemble de trois électrodes ECG fixes utilisées chez les nouveau-nés, les nourrissons et les patients en pédiatrie.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Application

Étape 1 Essuyer et supprimer tout excédent d'humidité de l'endroit où sera appliqué NeoHeart.

Étape 2 Retirer et jeter le film protecteur. Appliquer immédiatement après avoir retiré le film protecteur.

Étape 3 Placer NeoHeart sur le dos du patient et le brancher au câble du moniteur ECG. L'électrode doit être orientée de façon à ce que la pointe du cœur soit dirigée vers les membres inférieurs.

Étape 4 Confirmer la qualité du tracé ECG.

Remarque : Si le QRS est stable mais paraît petit ou atténue, envisagez de changer de fil sur le moniteur ou d'augmenter la taille de la forme d'onde. Si la forme d'onde demeure petite ou atténue, l'application à la poitrine du patient peut donner une onde plus consistante.

PRÉCAUTION : Si elle est placée sur la poitrine du patient,

l'électrode de fil blanc sera sur le côté gauche du patient. Insérer dans le moniteur comme prévu.

Retrait

Étape 1 Retirer NeoHeart dans les 24 heures.

Étape 2 Imprégnier d'eau ou de sérum physiologique la face exposée (en tissu) du NeoHeart.

Étape 3 Décoller doucement NeoHeart de la peau tout en tamponnant celle-ci et la face adhésive du NeoHeart avec de l'eau ou du sérum physiologique.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

La loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin.

L'électrode ECG NeoHeart ne doit être utilisée que sur des patients soumis à un suivi médical continu et directement assuré par des professionnels.

NeoHeart est conçu pour être utilisé sur le dos. Si elle est placée sur la poitrine du patient, l'électrode de fil blanc sera sur le côté gauche du patient. Insérer dans le moniteur comme prévu.

Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes ou une peau abimée. En cas d'irritation de la peau, cesser d'utiliser le produit immédiatement. Jeter NeoHeart 24 heures après l'ouverture du sachet. Jetable. Ne pas réutiliser.

Union Européenne: MDR EU 2017/745

Tout incident grave survenu en rapport avec ce dispositif doit être signalé à Neotech Products et à l'autorité compétente de l'État membre où est établi l'utilisateur et/ou le patient.

Italiano

NeoHeart® Tamponcino per ECG

INDICAZIONI D'USO

NeoHeart è un kit di tre elettrodi per ECG collegati utilizzabile su neonati, infanti e pazienti pediatrici.

ISTRUZIONI D'USO

Applicazione

Passo 1 Pulire e rimuovere l'eventuale umidità in eccesso dal punto in cui verrà applicato NeoHeart.

Passo 2 Staccare e gettare via la pellicola di protezione. Applicare immediatamente dopo aver rimosso la pellicola di protezione.

Passo 3 Posizionare NeoHeart sul dorso del paziente e collegarlo al cavo del monitor ECG. Il tamponcino deve essere orientato in modo tale che la punta del cuore sia rivolta verso le estremità inferiori.

Passo 4 Confermare la qualità di tracciamento ECG.

Nota: Se il QRS è stabile ma appare ridotto o attenuato, valutare la possibilità di passare a una derivazione diversa sul monitor o di aumentare le dimensioni della forma d'onda. Se la forma d'onda ridotta o attenuata persiste, è possibile produrre una forma d'onda più marcata tramite l'applicazione al torace del paziente.

PRECAUZIONE: Se posizionato sul torace, l'elettrodo con il filo bianco deve trovarsi sul lato sinistro del paziente. Inserire conseguentemente nel monitor.

Rimozione

Passo 1 Rimuovere NeoHeart entro 24 ore.

Passo 2 Bagnare il lato esposto (tessuto) del NeoHeart con acqua o soluzione salina.

Passo 3 Utilizzare acqua o soluzione salina per staccare lentamente NeoHeart e il lato adesivo di NeoHeart dalla pelle, continuando a tamponare la pelle.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La legge federale limita la vendita di questo dispositivo da parte o su prescrizione di un medico. Durante l'uso del tamponcino per ECG NeoHeart, il paziente deve essere costantemente e direttamente supervisionato dal personale sanitario. NeoHeart è progettato per l'applicazione sul dorso. Se posizionato sul torace, l'elettrodo con il filo bianco deve trovarsi sul lato sinistro del paziente. Inserire conseguentemente nel monitor. Non applicare su ferite aperte o pelle lesionata. Interrompere immediatamente in caso di irritazione cutanea. Descartare o NeoHeart 24 ore dall'apertura del sacchetto. Monouso. Non riutilizzare.

PRECAUZIONE: Se posizionato sul torace, l'elettrodo con il filo bianco deve trovarsi sul lato sinistro del paziente. Inserire conseguentemente nel monitor.

Passo 4 Rimuovere NeoHeart entro 24 ore.

Passo 5 Bagnare il lato esposto (tessuto) del NeoHeart con acqua o soluzione salina.

Passo 6 Rimuovere NeoHeart e il lato adesivo di NeoHeart dalla pelle, continuando a tamponare la pelle.

PRECAUZIONE: Se posizionato sul torace, l'elettrodo con il filo bianco deve trovarsi sul lato sinistro del paziente. Inserire conseguentemente nel monitor.

Passo 7 Rimuovere NeoHeart entro 24 ore.

Passo 8 Bagnare il lato esposto (tessuto) del NeoHeart con acqua o soluzione salina.

Passo 9 Rimuovere NeoHeart e il lato adesivo di NeoHeart dalla pelle, continuando a tamponare la pelle.

PRECAUZIONE: Se posizionato sul torace, l'elettrodo con il filo bianco deve trovarsi sul lato sinistro del paziente. Inserire conseguentemente nel monitor.

Passo 10 Rimuovere NeoHeart entro 24 ore.

Passo 11 Bagnare il lato esposto (tessuto) del NeoHeart con acqua o soluzione salina.

Passo 12 Rimuovere NeoHeart e il lato adesivo di NeoHeart dalla pelle, continuando a tamponare la pelle.

PRECAUZIONE: Se posizionato sul torace, l'elettrodo con il filo bianco deve trovarsi sul lato sinistro del paziente. Inserire conseguentemente nel monitor.

Passo 13 Rimuovere NeoHeart entro 24 ore.

Passo 14 Bagnare il lato esposto (tessuto) del NeoHeart con acqua o soluzione salina.

Passo 15 Rimuovere NeoHeart e il lato adesivo di NeoHeart dalla pelle, continuando a tamponare la pelle.

PRECAUZIONE: Se posizionato sul torace, l'elettrodo con il filo bianco deve trovarsi sul lato sinistro del paziente. Inserire conseguentemente nel monitor.

Passo 16 Rimuovere NeoHeart entro 24 ore.

Passo 17 Bagnare il lato esposto (tessuto) del NeoHeart con acqua o soluzione salina.

Passo 18 Rimuovere NeoHeart e il lato adesivo di NeoHeart dalla pelle, continuando a tamponare la pelle.

PRECAUZIONE: Se posizionato sul torace, l'elettrodo con il filo bianco deve trovarsi sul lato sinistro del paziente. Inserire conseguentemente nel monitor.

Passo 19 Rimuovere NeoHeart entro 24 ore.

Passo 20 Bagnare il lato esposto (tessuto) del NeoHeart con acqua o soluzione salina.

Passo 21 Rimuovere NeoHeart e il lato adesivo di NeoHeart dalla pelle, continuando a tamponare la pelle.

PRECAUZIONE: Se posizionato sul torace, l'elettrodo con il filo bianco deve trovarsi sul lato sinistro del paziente. Inserire conseguentemente nel monitor.

Passo 22 Rimuovere NeoHeart entro 24 ore.

Passo 23 Bagnare il lato esposto (tessuto) del NeoHeart con acqua o soluzione salina.

Passo 24 Rimuovere NeoHeart e il lato adesivo di NeoHeart dalla pelle, continuando a tamponare la pelle.

PRECAUZIONE: Se posizionato sul torace, l'elettrodo con il filo bianco deve trovarsi sul lato sinistro del paziente. Inserire conseguentemente nel monitor.

Passo 25 Rimuovere NeoHeart entro 24 ore.

Passo 26 Bagnare il lato esposto (tessuto) del NeoHeart con acqua o soluzione salina.

Passo 27 Rimuovere NeoHeart e il lato adesivo di NeoHeart dalla pelle, continuando a tamponare la pelle.

PRECAUZIONE: Se posizionato sul torace, l'elettrodo con il filo bianco deve trovarsi sul lato sinistro del paziente. Inserire conseguentemente nel monitor.

Passo 28 Rimuovere NeoHeart entro 24 ore.

Passo 29 Bagnare il lato esposto (tessuto) del NeoHeart con acqua o soluzione salina.

Passo 30 Rimuovere NeoHeart e il lato adesivo di NeoHeart dalla pelle, continuando a tamponare la pelle.

PRECAUZIONE: Se posizionato sul torace, l'elettrodo con il filo bianco deve trovarsi sul lato sinistro del paziente. Inserire conseguentemente nel monitor.

Passo 31 Rimuovere NeoHeart entro 24 ore.

Passo 32 Bagnare il lato esposto (tessuto) del NeoHeart con acqua o soluzione salina.

Passo 33 Rimuovere NeoHeart e il lato adesivo di NeoHeart dalla pelle, continuando a tamponare la pelle.

PRECAUZIONE: Se posizionato sul torace, l'elettrodo con il filo bianco deve trovarsi sul lato sinistro del paziente. Inserire conseguentemente nel monitor.

Passo 34 Rimuovere NeoHeart entro 24 ore.

Passo 35 Bagnare il lato esposto (tessuto) del NeoHeart con acqua o soluzione salina.

Passo 36 Rimuovere NeoHeart e il lato adesivo di NeoHeart dalla pelle, continuando a tamponare la pelle.

PRECAUZIONE: Se posizionato sul torace, l'elettrodo con il filo bianco deve trovarsi sul lato sinistro del paziente. Inserire conseguentemente nel monitor.

Passo 37 Rimuovere NeoHeart entro 24 ore.

Passo 38 Bagnare il lato esposto (tessuto) del NeoHeart con acqua o soluzione salina.

Passo 39 Rimuovere NeoHeart e il lato adesivo di NeoHeart dalla pelle, continuando a tamponare la pelle.

PRECAUZIONE: Se posizionato sul torace, l'elettrodo con il filo bianco deve trovarsi sul lato sinistro del paziente. Inserire conseguentemente nel monitor.

Passo 40 Rimuovere NeoHeart entro 24 ore.

Passo 41 Bagnare il lato esposto (tessuto) del NeoHeart con acqua o soluzione salina.

Passo 42 Rimuovere NeoHeart e il lato adesivo di NeoHeart dalla pelle, continuando a tamponare la pelle.

PRECAUZIONE: Se posizionato sul torace, l'elettrodo con il filo bianco deve trovarsi sul lato sinistro del paziente. Inserire conseguentemente nel monitor.

Passo 43 Rimuovere NeoHeart entro 24 ore.

Passo 44 Bagnare il lato esposto (tessuto) del NeoHeart con acqua o soluzione salina.

P

